

トリフルリジン・チピラシル(ロンサーフ)+BV

day

| 薬剤名               | 投与量               | 投与方法                                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ～ | 28 |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| ベバシズマブ<br>生理食塩液   | 5.0mg/kg<br>100ml | 点滴静注<br>初回：90分<br>2回目：60分<br>以降：30分 | ↓ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | ↓  |    |    |    |    |   |    |
| トリフルリジン<br>・チピラシル | 70mg/m2<br>★参照    | 分2 食後                               | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 |   | 夕 | 朝 | 朝  | 朝  | 朝  | 朝  |    |    |    |    |    |    |   |    |

催吐性リスク 軽度

★トリフルリジン・チピラシル投与量

- 1.07㎡未満 70mg/分2
- 1.07㎡以上1.23㎡未満 80mg/分2
- 1.23㎡以上1.38㎡未満 90mg/分2
- 1.38㎡以上1.53㎡未満 100mg/分2
- 1.53㎡以上1.69㎡未満 110mg/分2
- 1.69㎡以上1.84㎡未満 120mg/分2
- 1.84㎡以上1.99㎡未満 130mg/分2
- 1.99㎡以上2.15㎡未満 140mg/分2
- 2.15㎡以上 150mg/分2