day

| 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------|-----------|------|---------------|---------------|--------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| パロノセトロン | 0.75mg | 点滴静注 | \rightarrow | | | | | | | | | | | | | |
| デキサメタゾン | 6.6mg | 5分 | | | | | | | | | | | | | | |
| レボホリナート | 200mg/m2 | 点滴静注 | \ | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 250ml | 2時間 | | | | | | | | | | | | | | |
| イリノテカン | 150mg/m2 | 点滴静注 | \ | | | | | | | | | | | | | |
| 5%ブドウ糖液 | 250ml | 90分 | | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル | 400mg/m2 | 点滴静注 | \downarrow | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50ml | 10分 | | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル | 2400mg/m2 | 点滴静注 | \downarrow | \rightarrow | \downarrow | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 100ml | 46時間 | | | | | | | | | | | | | | |

催吐性リスク 中等度