

CAPIRI + BV

day

| 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ベバシズマブ 生理食塩液 | 7.5mg/kg 100ml | 点滴静注 初回：90分 2回目：60分 以降：30分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パロノセトロン デキサメタゾン | 0.75mg 9.9mg | 点滴静注 5分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イリノテカン 5%ブドウ糖液 | 200mg/m2 250ml | 点滴静注 90分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カペシタビン ★参照 | 1600mg/m2 | 分2 食後 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | | | | | | |

催吐性リスク 中等度

★カペシタビン投与量

| | |
|----------------|-----------|
| 1.31㎡未満 | 1800mg/分2 |
| 1.31㎡以上1.69㎡未満 | 2400mg/分2 |
| 1.69㎡以上2.07㎡未満 | 3000mg/分2 |
| 2.07㎡以上 | 3600mg/分2 |