

G-CHOP【1コース】

day

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
プレドニゾン 生理食塩液	100mg 100ml	点滴静注 30分	↓																				
プレドニゾン	100mg	経口		↓	↓	↓	↓																
オビヌツズマブ 生理食塩液	1000mg 210ml	点滴静注 初回：6時間 2回目以降 ：4時間	↓							↓							↓						
グラニセトロン	3mg	点滴静注 30分	↓																				
ビンクリスチン 生理食塩液	1.4mg/m ² 50ml	点滴静注 15分	↓																				
ドキシルビシン 生理食塩液	50mg/m ² 100ml	点滴静注 30分	↓																				
シクロホスファミド 生理食塩液	750mg/m ² 500ml	点滴静注 2時間	↓																				

★オビヌツズマブ投与30分前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤を内服。

催吐性リスク 高度 アプレピタントを考慮

G-CHOP【2コース以降】

day

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
プレドニゾン 生理食塩液	100mg 100ml	点滴静注 30分	↓																				
プレドニゾン	100mg	経口		↓	↓	↓	↓																
オビヌツズマブ 生理食塩液	1000mg 210ml	点滴静注 4時間	↓																				
グラニセトロン	3mg	点滴静注 30分	↓																				
ビンクリスチン 生理食塩液	1.4mg/m2 50ml	点滴静注 15分	↓																				
ドキシルビシン 生理食塩液	50mg/m2 100ml	点滴静注 30分	↓																				
シクロホスファミド 生理食塩液	750mg/m2 500ml	点滴静注 2時間	↓																				

★オビヌツズマブ投与30分前に解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤を内服。

催吐性リスク **高度** **アプレピタントを考慮**