

GC

day

| 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|--------------------|--------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ソルデム3A 硫酸Mg補正液 | 500ml 8mEq | 点滴静注 2時間 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| ソルデム3A 硫酸Mg補正液 | 500ml 8mEq | 点滴静注 2時間 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| パロノセトロン デキサメタゾン | 0.75mg 6.6mg | 点滴静注 5分 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| 20%マンニトール | 300ml | 点滴静注 1時間 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン 生理食塩液 | 25mg/m2 250ml | 点滴静注 1時間 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| ゲムシタビン 5%ブドウ糖液 | 1000mg/m2 100ml | 点滴静注 30分 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |

催吐性リスク

高度

アプレピタントを考慮