

EPd 【1～2コース】

day

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン 生理食塩液	6.6mg 20mg 5mg 50ml	点滴静注 5分	↓							↓							↓						
生理食塩液	100ml	点滴静注 45分	↓							↓							↓						
デキサメタゾン	28mg (75歳超では8mg)	経口	↓							↓							↓						
エロツズマブ 生理食塩液	10mg/kg 体重50kg未満：生食150ml 体重50-90kg：生食250ml 体重90kg超：生食350ml	点滴静注 初回：2時間～ 2回目：45分～ 以降：30分～	↓							↓							↓						
ポマリドミド	4mg	経口	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
薬剤名	投与量	投与方法	22	23	24	25	26	27	28														
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン 生理食塩液	6.6mg 20mg 5mg 50ml	点滴静注 5分	↓																				
生理食塩液	100ml	点滴静注 45分	↓																				
デキサメタゾン	28mg (75歳超では8mg)	経口	↓																				
エロツズマブ 生理食塩液	10mg/kg 体重50kg未満：生食150ml 体重50-90kg：生食250ml 体重90kg超：生食350ml	点滴静注 30分～	↓																				
ポマリドミド	4mg	経口																					

★エロツズマブ投与45～90分前までに解熱鎮痛剤を内服。

**催吐性リスク 軽度**

EPd 【3コース以降】

day

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン 生理食塩液	6.6mg 20mg 5mg 50ml	点滴静注 5分	↓																				
生理食塩液	100ml	点滴静注 45分	↓																				
デキサメタゾン	28mg (75歳超では8mg)	経口	↓							↓							↓						
エロツズマブ 生理食塩液	20mg/kg 体重50kg未満：生食150ml 体重50-90kg：生食250ml 体重90kg超：生食350ml	点滴静注 30分～	↓																				
ポマリドミド	4mg	経口	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
薬剤名	投与量	投与方法	22	23	24	25	26	27	28														
デキサメタゾン	28mg (75歳超では8mg)	経口	↓																				
ポマリドミド	4mg	経口																					

★エロツズマブ投与45～90分前までに解熱鎮痛剤を内服。