

ERd 【1～2コース】

day

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン	6.6mg	静注 [側管]	↓							↓							↓						
ファモチジン	20mg	静注 [側管]	↓							↓							↓						
デキサメタゾン	28mg	経口	↓							↓							↓						
エロツズマブ 生理食塩液	10mg/kg 体重50kg未満：生食150ml 体重50-90kg：生食250ml 体重90kg超：生食350ml	点滴静注 初回：2時間～ 2回目：1時間～ 以降：30分～	↓							↓							↓						
レナリドミド	25mg	経口	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
薬剤名	投与量	投与方法	22	23	24	25	26	27	28														
デキサメタゾン	6.6mg	静注 [側管]	↓																				
ファモチジン	20mg	静注 [側管]	↓																				
デキサメタゾン	28mg	経口	↓																				
エロツズマブ 生理食塩液	10mg/kg 体重50kg未満：生食150ml 体重50-90kg：生食250ml 体重90kg超：生食350ml	点滴静注 30分～	↓																				
レナリドミド	25mg	経口																					

★エロツズマブ投与30～90分前までに解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤を内服。

催吐性リスク 軽度

ERd 【3コース以降】

day

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン	6.6mg	静注 [側管]	↓														↓						
ファモチジン	20mg	静注 [側管]	↓														↓						
デキサメタゾン	28mg	経口	↓														↓						
デキサメタゾン	40mg	経口								↓													
エロツズマブ 生理食塩液	10mg/kg 体重50kg未満：生食150ml 体重50-90kg：生食250ml 体重90kg超：生食350ml	点滴静注 30分～	↓														↓						
レナリドミド	25mg	経口	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
薬剤名	投与量	投与方法	22	23	24	25	26	27	28														
デキサメタゾン	40mg	経口	↓																				
レナリドミド	25mg	経口																					

★エロツズマブ投与30～90分前までに解熱鎮痛剤・抗ヒスタミン剤を内服。