

IsaPd 【1コース】

day

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン 生理食塩液	40mg (75歳以上は20mg) 20mg 5mg 50ml	点滴静注 15分	↓							↓							↓						
イサツキシマブ 生理食塩液	10mg/kg 250ml	点滴静注 90分～ 体重により変動 2回目以降は 時間短縮あり	↓							↓							↓						
ポマリドミド	4mg	経口	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
薬剤名	投与量	投与方法	22	23	24	25	26	27	28														
デキサメタゾン ファモチジン クロルフェニラミン 生理食塩液	40mg (75歳以上は20mg) 20mg 5mg 50ml	点滴静注 15分	↓																				
イサツキシマブ 生理食塩液	10mg/kg 250ml	点滴静注 90分～ 体重により変動	↓																				
ポマリドミド	4mg	経口																					

★イサツキシマブ投与15～60分前までに解熱鎮痛剤を内服。

催吐性リスク 軽度

IsaPd 【2コース以降】

day

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デキサメタゾン	40mg (75歳以上は20mg)	点滴静注	↓														↓						
ファモチジン クロルフェニラミン 生理食塩液	20mg 5mg 50ml	15分	↓														↓						
イサツキシマブ 生理食塩液	10mg/kg 250ml	点滴静注 90分～ 体重により変動	↓														↓						
デキサメタゾン	40mg (75歳以上は20mg)	経口								↓													
ポマリドミド	4mg	経口	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
薬剤名	投与量	投与方法	22	23	24	25	26	27	28														
デキサメタゾン	40mg (75歳以上は20mg)	経口	↓																				
ポマリドミド	4mg	経口																					

★イサツキシマブ投与15～60分前までに解熱鎮痛剤を内服。